



D-mine[®] Care Lebensalltag mit Pen- & Pumpentherapie

Rahel Lüps, 21.06.2023

Blitzlicht





Ein gemeinsames Ziel:

Lebensqualität so gut wie möglich zu verbessern und zu erhalten


Wie kann das gelingen?



Für eine erfolgreiche Therapie ist das Zusammenspiel eines Teams erforderlich

- niedergelassener Neurologe/in
- spezialisierte Parkinsonklinik
- soziales und therapeutisches Umfeld des Betroffenen
- bedürfnisorientiertes Patientenbündnis
- professioneller Patientenservice

Parkinson ist nicht gleich Parkinson



- aufstehen
- anziehen
- Einkäufe erledigen
- im Garten arbeiten
- Termine außer Haus wahrnehmen
- Freizeitaktivitäten ausüben
- ...

Welche Off-Phasen gibt es über den Tag?



Plötzlich auftretenden OFF- Phasen (z.B. ggf. vor geplanten Aktivitäten wie Einkauf, Besuche, Spaziergänge einsetzen)



OFF-Zuständen beim Aufwachen (Early-morning-OFF)



Vorhersehbare OFF- Phasen (z.B. nach Mahlzeiten)



bei verzögertem Wirkeintritt oder Ausbleiben der Wirkung der oralen Therapie (Gastroparese, Schluckstörungen, Resorptionsstörung-Proteine, Darm-Motilitätsstörung, End of dose Wearing-OFF)



bei nächtlichen Dystonien und Schlafbeschwerden




- schneller Wirkeintritt
- gezielter Einsatz
- orale Medikation wird i.d.R. beibehalten
- einfache Testung
- minimal invasiv
- speziell für die subkutane Parkinson-Therapie entwickelt

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt wie die Behandlungsstrategie angepasst werden kann.



Quellen:

1. Trenkwalder C et al., Expert Consensus Group Report on the use of apomorphine in the treatment of Parkinson's disease-clinical practise recommendations. Parkinsonism Relat. Disord. 2015; 21(9): 1023-1030
2. Trenkwalder C. et al.: Intermittierende Apomorphin-Injektionen als Rescue-Therapie beim fortgeschrittenen M. Parkinson – Konsensusstatement. Nervenarzt 2008; 79 (4):475-479





Gute bis sehr gute Symptomkontrolle und dann?





- kontinuierliche Medikamentenabgabe
- schneller Wirkeintritt
- zusätzliche Bolusgabe möglich
- orale Medikation wird i.d.R. reduziert
- einfache Testung
- minimal invasiv
- speziell für die subkutane Parkinson-Therapie entwickelt

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt wie die Behandlungsstrategie angepasst werden kann.

extra große Bolustaste einfach zu ertasten und auszulösen zur schnellen Zusatzgabe bei Bedarf

automatisierte Befüllung zur einfachen Anwendung bei eingeschränkter Motorik


diskrete und kleine Pumpe ohne Spritzenaufsatz

intuitive Handhabung durch Schritt-für-Schritt-Anleitung



großes Farb-Display mit Soft-Bedientasten

schneller Einsatz durch wenig Vorbereitungsschritte



Bleiben Sie **wissbegierig** und **erkundigen Sie sich frühzeitig nach aktuellen Therapiemöglichkeiten**, um bei einer eventuell notwendigen Therapieanpassung informiert zu sein. Dies unterstützt Sie bei Ihrer Entscheidung.



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!